fleurs ♂, soit une bonne espèce ; sa taille est très différente de celle du type.

25. **Euphorbia adenopoda** Baill.

De nouveaux échantillons de la forme de l'Ouest, légèrement distincte de la forme typique du Sambirano (feuilles plus courtes, pubescentes, inflorescence moins robuste), étendent beaucoup l'aire de cette espèce, surtout vers le sud : régions de Maevatanana (*Perrier de la Bâthie* 824, 824 *bis*) et de Majunga (*Perrier* 9543), haut Bemarivo (*Perrier* 9634) ; Ankarafantsika (*service des Forêts* 1933, 56) ; Tsingy du Bemara (*Leandri* 918). Elle se rencontre particulièrement dans les stations sèches (rocailles calcaires par exemple).

MATÉRIAUX POUR LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

par A. GUILLAUMIN

LXXXIII. APOCYNACÉES NOUVELLES

Bien que j'aie donné assez récemment une révision des Apocynacées (1), il y a lieu d'y ajouter les espèces nouvelles suivantes, et il est à peu près certain qu'il y a encore d'autres espèces inédites ; par contre le *Parsonsia brachycarpa* de BAILLON est une Asclépiadacée, et son *P. angustifolia* est basé sur deux échantillons dont l'un est bien un *Parsonsia* mais l'autre un *Marsdenia* (Asclépiadacée).

Ochrosia Vieillardii Guillaum. sp. nov.

Arbuscula 2 m. alta, erecta, ramis gracilibus ; foliis 3-nis, cuneatis (3-6 cm. x 1-1,6 cm.), coriaceis, apice obtusis rotundatisve, basi in petiolum 1 cm. longum sensim attenuatis, nervis immersis haud vel parum

(1) In *Bull. Soc. Bot. France*, 88, p. 358, 1941.

conspicuis. Inflorescentiae 2-3 cm. longae, vulgo simplices, cicatricibus notatae, floribus sessilibus, sepalis fere usque ad basin liberis, ovatis, 5 mm. longis, dorso praecipue ad basin carinatis, corolla 1,4 cm. longa, lobis ovatis, 3 mm. longis, staminibus..., carpellis 2, liberis, ovulis in quoque loculo 6, 2-seriatis. Drupae rhomboidae, complanatae (2,2 cm. × 1,8 cm. × 0,9 cm.), apice basique acutae, leviter curvatae, uno latere longitudinaliter medio sulcatae.

Sans localité (*Vieillard* 961), Gatope (*Vieillard* 2955).

Caractérisé par ses feuilles non obovales, progressivement et non brusquement atténuées en pétiole et par ses fruits moitié plus petits que ceux d'O. *parviflora*.

Artia coriacea Guillaum., sp. nov.

Scandens, ramis gracilibus, glaberrimis ; foliis 3-4- nis, oblanceolatis (circa 5 cm. × 1,5 cm.), basi obtuse cuneatis, apice emarginatis apiculatisve, vel lineatribus, (5,9 cm. × 0,8-1,2 cm.), basi rotundatis, apice acutis fere pungentibus vel rotundatis apiculatisve, valde coriaceis, glaberrimis, in utraque pagina nervis venisque valde prominentibus, petiolo 3-8 cm. longo. Inflorescentiae axillares, dense fasciculatae, 1 cm. longae, floribus 5 mm. longis, fere sessilibus, sepalis glaberrimis, fere omnino liberis, 2 mm. longis, anguste ovatis, acuminatis, basi intus squamatis, corollae lobis ovatis, apiculatis, glaberrimis, tubo aequilongis, fauce 5-squamatis, intus longitudinaliter barbatis, antheris 2 mm. longis, ovario depresse cylindrico, glabro, stylo ovario longiore. Fructus 5-8 cm. longi, lignosi.

Balade (*Vieillard* 942), Gomonen (*Vieillard*), Gatope (*Deplanche* 469 in *Vieillard* 2995), Tanlé, Arama (*Deplanche* 469 in *Vieillard* 2995).

Bien distinct des 2 autres espèces du genre par ses feuilles lancéolées-linéaires.

Parsonsia laxiflora Guillaum. sp. nov.

Ramis gracilibus, brevissime rufo-puberulis ; foliis oppositis, linearibus (6-8 cm. × 0,3-0,8 cm.), basi rotundatis, apice acutis, membranaceis vel rigide membranaceis, nervis immersis, petiolo circa 5 mm. longo, brevissime rufo-puberulo. Inflorescentiae terminales, usque ad 8 cm. longae, laxe cymosae, brevissime puberulae, floribus 5 mm. longis, pedicello aequilongo, brevissime puberulo, calyce ad medium fisso, lobis ovatis, extra brevissime puberulis, corollae lobis lanceolatis, tubo intus fauce barbato aequilongis, extra brevissime puberulis, intus glabris, staminum filamentis leviter pilosis, antheris angustissimis, basi filiforme